



Consejos de administracion de calostro.

Munashe Chigerwe
University of California Davis



El objetivo de esta discusión

- El objetivo de esta discusión es:
 - Explicar por qué es importante la alimentación con calostro para becerras lecheras.
 - Saber cuándo alimentar el calostro, cuánto alimento dar, cómo alimentar y cómo comprobar si alimentamos lo suficiente.
 - Discutir si la alimentación insuficiente de calostro es un problema en California.
- 



¿Por qué es importante el calostro para los becerros?

- Los becerros no reciben protección mientras la vaca está embarazada.
- El calostro es la única forma de obtener protección inmune después del nacimiento.
- Ingestión insuficiente de calostro aumenta la enfermedad y la muerte.
- Enfermedad = diarrea y neumonía.
- Cuando se convierten en vacas = disminuye la leche.

¿Cuándo debemos alimentar calostro a los terneros?

- Recoger el calostro de vaca poco después del nacimiento, si es posible, o usar el calostro congelado..
- Dar al becerro calostro inmediatamente después del nacimiento = dentro de las primeras 2 horas es lo adecuado.



¿Cuánto calostro debemos alimentar?

- Primera alimentación: 2 cuartos dentro de 2 horas después del nacimiento.
- Segunda: alimentación de 2 cuartos de galón a las 12 horas de edad.
- Dentro de las 24 horas la alimentación total = 4 cuartos de galón.



¿Cómo debemos alimentar el calostro?

- Por botella
- Por tubo



¿Cómo sabemos que alimentamos la suficiente cantidad de calostro?

- ▶ La prueba de sangre se debe hacer 1- 6 días de edad: UC Davis puede hacer esta para usted si está interesado.



¿A cuántos terneros no se les alimenta con suficiente calostro en California?

- 1 de 5 becerras lecheras, son alimentadas con el calostro insuficiente.
- Aumentan enfermedades y muerte entre los becerros.
- Pérdidas de dinero a través de tratamientos y facturas de Veterinarias.



En resumen



• Nace el becerro

• Recoger el calostro de la vaca durante 2 horas o usar calostro congelado.

• Alimente 2 cuartos dentro de 2 horas después del nacimiento

• Alimente 2 cuartos a las 12 horas

• Asegúrese de que los becerros tengan la suficiente cantidad de calostro entre 1-6 días.