



# Jardinería de vegetales por todo el año en el condado de Sonoma

Vegetales	Período de Plantar	Fresco/Cálido Directo/Trasplante	Espacio entre las plantas (pulgadas)	Días a madurez	Cosecha
ESPÁRAGO (plántulas)	ene-mar	T	12	2-4 años	2 años después de plantar los cuellos/raíces
CHÍCHAROS	ene-abr	F, D	2-4	60-80	Quite vainas regularmente para extender la cosecha
CEBOLLAS (bulbo)	ene-mayo	F,D/T	4-5	90-150	Después de que las hojas se marchiten y se doblen
RÚGULA	feb-mar	F, D/T	6	30-40	Corte las hojas nuevas muy antes de florecer
BOK-CHOY	feb-mar	F, D/T	6-12	40-60	Corte las hojas exteriores cuando las cabezas llegan a 10-12 pulgadas
ESPINACAS	feb-mar	F, D/T	3-4	40-50	Corte hojas exteriores o la planta entera
NABO	feb-mar	F, D	2-6	45-75	Empiece a cosechar cuando el bulbo llega a 2-3 pulgadas
RÁBANO	feb-abr	F, D	1	20-60	Empezando 3 semanas después de sembrar
PAPAS (no dulce)	feb-mayo	F, D	12-18	90-120	Saque después de florecer cuando las hojas se marchitan
PUERRO	feb-jul	F, T	2-4	120-150	Cuando los tallos llegan a 1/2 - 2 pulgadas de ancho
ACELGAS	feb-ago	F, D/T	12	60-80	Corte hojas exteriores cuando la planta llega a 12-18 pulgadas
LECHUGA (de cabeza/hoja)	feb-oct	F, D/T	4-12	50-60	Corte las hojas exteriores o la planta entera
CILANTRO	feb - oct	F, D/T	18	50-55	Corte hojas/Espere 90 días para semillas
BRÓCOLI	mar-abr	F, T	18-24	60-80	Corte la cabeza central con brotes apretados
COL/REPOLLO	mar-abr	F, T	24-30	65-120	Cuando está firme y antes de que se parta la cabeza
COLIFLOR	mar-abr	F, T	18-24	80-110	Cuando las cabezas llegan a tamaño
COLIRÁBANOS	mar-abr	F, D	4-6	50-70	Cuando el bulbo está de 2-3 de ancho
BETABEL (Remolacha)	mar-ago	F, D	3	55-70	Cuando el bulbo está de 1-3" de ancho
ZANAHORIA	mar-sep	F, D	2	120-150	Cuando las raíces están a 1" de diámetro
CEBOLLITAS (en grupo)	mar-oct	F, D/T	1-2	70-80	Cuando las hojas están de 12-18" de alto
COL RIZADA	mar-nov	F, D/T	18-36	65-75	Corte las hojas de afuera o la planta entera
ESPÁRAGO (plántulas)	abr-jun	F, T	12	3-4 años	Corte brotes de 5-8"; coseche ligeramente el 3er año
APIONABO	abr-jun	F, T	6-8	150-160	Cuando las raíces están a 3" de ancho
OKRA (Quingombó)	abr-jun	C, T	12-18	70-80	Cuando están de 2.5-3" de largo
PIMENTONES y CHILES	abr-jun	C+, T	18-24	65-85	Coseche verde o espere cambio de color
CALABAZA DE LINTERNA	abr-jun	C, D/T	48-96	100-120	Cuando la cáscara está dura
TOMATILLOS	abr-jun	C, T	10	70-80	Cuando la fruta abre la cáscara de papel
TOMATES/ (Jitomates)	abr-jun	C+, T	18-36	50-90	Cuando fruta está blanda y cambia de color

Vegetales	Periodo de Plantar	Fresco/Cálido Directo/ Trasplante	Espacio entre las plantas (pulgadas)	Días a madurez	Cosecha
MAÍZ DULCE	abr-jul	C, D	12	65-100	3 semanas después de que aparezca la barba
PEPINO	abr-jul	C+, D/T	12-36	50-75	Sáquelos a medida que se vayan madurando para prolongar la cosecha
CALABACITAS (de verano)	abr-jul	C, D/T	25-60	50-60	Cuando esten pequeñas y tiernas
BERENJENA	mayo	C+, T	18	60-80	Cuando se desarrolla el color
MELONES	mayo-jun	C+, D/T	12	85-120	Madurez depende de la variedad
CHIRIVÍA	mayo-jun	F D	3	90-120	Cuando está madura, antes de florecer
CALABAZA (invierno)	mayo-jun	C, D/T	24-48	80-120	Cáscara debe estar completamente dura
EJOTE (treparadora y arbusto)	mayo-jul	C, D	1-3	48-70	Quite vainas maduras para prolongar la cosecha
ALCACHOFA	mayo-sep	F, D/T	24-48	130-190	Coseche brotes apretados la primavera siguiente
APIO	jun-jul	F, T	6	90-170	Corte los tallos de afuera o la planta entera
COL DE BRUSELAS	jul-ago	F, T	24	100-150	Coseche brotes de 1-2" de ancho antes de que las hojas se amarilleen
COL	jul-ago	F, T	24-30	65-120	Cuando esta firme y antes de partirse la cabeza
BRÓCOLI	jul-sep	F, T	18-24	90-110	Corte la cabeza central con brote apretado
COL CHINA	jul-sep	F, D/T	12-18	70-85	Cabezas enteras, firmes y bien formadas
VERDURAS, variedades	jul-oct	F, D	2-6	35-45	La cosecha varía, pero antes de florecer
ESPINACAS	jul-oct	F, D/T	3-4	40-50	Corte hojas exteriores o la planta entera
COLINABO	ago	F, D	6	90	Cuando raíces llegan a 2-3" de diámetro
COLIFLOR	ago-sep	F, T	18-24	80-110	Cuando las cabezas llegan a tamaño
ACHICORIA & ACH. ROJA	ago-sep	F, D	12	80-90	Coseche hojas pequeñas en 40-50 días
ENDIBIA & ESCAROLA	ago-sep	F, D	8-10	60-80	Coseche hojas, inviernan muy bien
COLIRRÁBANOS	ago-sep	F, D	4-6	60-70	Cuando el bulbo llega a 2-3" de ancho
CEBOLLA (bulbo)	ago-sep	F, D/T	4-5	90-150	Cuando las hojas se amarillean y se marchitan
RÁBANOS, japonés y de invierno	ago-sep	F, D	4-8	50-70	Coseche raíces de 2" de ancho
NABO	ago-sep	F, D	2-6	30-55	Coseche después de 75 días
BOK CHOY, PAK CHOY	ago-oct	F, D/T	6-12	30-60	Cuando cabezas llegan a 10-12" de alto
CHÍCHAROS, GUI SANTES	ago-oct	F, D	2-4	60-80	Quite vainas maduras para prolongar la cosecha
CANÓNIGO	sept-oct	F, D	2	80	Coseche hojas; inviernan muy bien
RÁBANOS	sep-oct	F, D	1	20-60	Se puede cosechar después de 3 semanas
AJO	oct-nov	F, D	3	120-185	Coseche a fines de junio, deje de regar el último mes
RUIBARBO	dic-mar	F, D/T	36	-	Si sembrado, después de 3 años. Si de plántulas, 1 año.

*F = cultivo de la temporada FRESCA, que crece mejor en temperaturas del suelo entre 60-65 grados y temperaturas del aire entre 55-75 grados*

*C = cultivo de la temporada CÁLIDA que crece mejor en temperaturas del suelo entre 65-80 grados y temperaturas del aire entre 65-95 grados y un poco fresco de noche*

*C+ = cultivos de la temporada CÁLIDA*

*A = que necesitan protección extra para mantenerlos calientes si se siembra temprano en la temporada*

*D = generalmente sembrado DIRECTAMENTE (de semillas) en el jardín*

*T = cultivos generalmente plantados usando plántulas TRASPLANTADAS*

*D/T = pueden ser cultivados de semillas (directamente) o plántulas (trasplantadas)*

*"Período de plantar" indica fechas aproximadas para realizar la siembra directa o la trasplante de plántulas. y pueden variar según el clima, su microclima y otras condiciones de tiempo.*

*Para el cultivo de vegetales que normalmente se siembran directamente, (como zanahoria, chícharos, frijoles y ejotes), empiece a contar "Días a madurez" desde la fecha que se siembra la semilla.*

*Para el cultivo de vegetales que normalmente se trasplantan, (como berenjena, chiles, pimentón y tomates) empiece a contar "días a madurez" desde la fecha en que se pone la plántula*

*Use "Días a madurez" para planear plantaciones sucesivas*

*El número real de días entre la siembra y la cosecha depende de la variedad y del clima en su área en ese año. Los vegetales que se hayan plantado en el otoño puede tomar mucho mas tiempo para madurar ya que las temporadas de otoño e invierno son frescas.*

*Para más información, consulte la guía "[Resumen del Cultivo de Hortalizas](#)" del condado de Sonoma y artículos sobre cultivos individuales en el [sitio de web de los Maestros Jardineros del Condado de Sonoma](#)*

Si necesita más ayuda con sus problemas del jardín, los Jardineros Maestros del Condado de Sonoma estamos para servirle. Puede Ud. llamar al 707-565-2608 (y pedir a un intérprete), o visitar nuestra oficina en 133 Aviation Blvd., #109, Santa Rosa (University of California Cooperative Extension). También puede consultar nuestro sitio de web: <http://sonomamg.ucanr.edu/es/>.

La Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento de cualquier persona en cualquiera de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión completa de la declaración de política antidiscriminatoria en <http://ucanr.edu/sites/anrstaff/files/215246.pdf>)